

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

DLF 24 - 11 020 / 2076
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE »

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. (88) 61 49 50 Poste 457

ABONNEMENT ANNUEL:

Régisseur de recettes D.D.A.

2, rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 5.508.00 F

Bulletin n° 31

17 novembre 1982

GRANDES CULTURES



/CÉRÉALES/

JAUNISSE NANISANTE

Compte tenu de l'installation du froid, les populations de pucerons susceptibles de transmettre le virus de la jaunisse nanisante, régressent rapidement. Il n'y a donc plus lieu d'intervenir.

De nombreux jaunissements, suivis du dessèchement des feuilles extérieures, sont observés sur les jeunes céréales et sont d'origine physiologique (manque d'azote ...).

Exceptionnellement, certains symptômes constatés sur semis très précoces pourraient être attribués à la jaunisse nanisante, mais cela ne concerne, pour l'instant, que de rares situations et aucun traitement ne peut, de toute façon, être envisagé lors de l'apparition des symptômes.




« Clé pour la détermination des pucerons... » ADAS. ACTA



Sitobion avenae sans aile

p. 25
.../...

COLZA



Larves d'altise au dernier stade larvaire

LARVES DE GROSSE ALTISE

Des comptages réalisés depuis la parution du dernier bulletin d'Avertissements Agricoles ont révélés les infestations suivantes, très variables d'une parcelle à une autre, en fonction de son passé, voire de sa situation.

Visiter en conséquence vos parcelles (comptages sur 50 pieds) pour déterminer le niveau d'infestation.

SEUIL DE TRAITEMENT : 2 pieds/3 portant au moins 1 larve

Si ce seuil est dépassé, consulter le bulletin d'Avertissements Agricoles n° 30 du 29 octobre pour décider d'un traitement et pour le choix des produits.

MEURTHE - ET - MOSELLE										MEUSE			MOSELLE			
AMANCE	CRANTENOY	CRANTENOY	CRION	ENAMENIL	LAITRE S/AMANCE	LES BARRAQUES	LONGUYON	MONCEL-LES- LUNEVILLE	TANTONVILLE	BROUSSEY-EN- WOEVRE	DEMANGE-AUX- EAUX	SOUILLY	COURCELLES- CHAUSSEY	GARCHE	LINDRE-BASSE	LUTTANGE
-	+	-	-	+	*	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	●
:80%	:18%	:100%	:95%	:20%	:50%	:14%	:44%	:7%	:87%	:4%	:8%	:75%	:46%	:0%	:20%	:20%

BAS - RHIN										HAUT - RHIN							
AUENHEIM	CROETTWILLER	INGOLSHEIM	LA WANTZENAU	NIEDERROEDERN	OFFENDORF	SCHOENENBOURG	SEEBACH	BANTZENHEIM	BERNWILLER	FESSENHEIM	HERRLISHEIM	NEUF-BRISACH	PULVERSHEIM	ROUFFACH	SPECHBACH- LE-HAUT	WALTENHEIM	WITTELSHEIM
-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:56%	:96%	:11%	:44%	:59%	:30%	:88%	:31%	:11%	:13%	:88%	:20%	:48%	:0%	:20%	:100%	:85%	:44%
					⊕												

LEGENDE :

- sans traitement
- * traitement sol
- ⊕ traitement semences
- + traitement sur adultes
- absence d'information

Au vu des résultats, et malgré des informations souvent incomplètes, il semblerait qu'en l'absence totale de traitement, une intervention se justifie.